

Biópsia Torácica do que se trata?

Consiste na remoção de uma amostra do tecido pulmonar através de uma agulha com auxílio de TAC (tomografia axial computadorizada).

Biópsia é realizada pelo Médico com apoio de um Enfermeiro e Técnico de Radiologia

IMAGIOLOGIA




Serviço de Imagiologia
Localização: Piso 2, Zona Central
Tel.: 214 348 200 - Geral
214 348 281 - Imagiologia
E-mail: sec.imagiologia@hff.min-saude.pt

DI.0332/E.IMAG/Versão 01/07-06-2019/Biópsia Aspirativa Torácica
H.F.F./U.C.I.Mod.2/Imagiologia /Junho 2019

BIÓPSIA ASPIRATIVA TORÁCICA

INFORMAÇÃO PARA O UTENTE E FAMÍLIA
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE

SERVIÇO IMAGIOLOGIA



Cuidados especiais antes da biópsia

1º Fazer jejum de algumas horas (3/4h);

2º Não precisa de suspender a sua medicação, excepto antiagregantes e/ou anticoagulantes (Aspirina, Varfine, Clopidogrel) que deverão ser parados alguns dias antes mas sob indicação médica.

No dia do exame deve trazer

1º Requisição;

2º Outros exames dirigidos à área a punccionar, nomeadamente resultados de biópsias anteriores.

Como se realiza este exame?

Ser-lhe-á pedido para se deitar numa posição confortável e deverá permanecer imóvel durante o exame;

Será efectuada uma TAC;

Segue-se a punção e aspiração com recolha de material a analisar.

A biópsia é efectuada com uma agulha fina, direccionada ao nódulo para obtenção de uma amostra para análise.

Na maioria dos casos, uma única punção é suficiente para a colheita de células.



Cuidados Pós exame

Permanecerá no recobro cerca de 2 a 3 horas, após o qual realizará nova TAC de controlo;

Poderá ter de ficar internado caso surja alguma intercorrência;

Na maioria das vezes não surgem quaisquer complicações, podendo retomar a sua rotina normal no dia seguinte;

Se surgir algum desconforto, dor ou equimose (“nódoa negra”), pode aplicar um pouco de gelo;

Pode tomar **PARACETAMOL** caso tenha dor;

Em geral, o desconforto é ligeiro e desaparece rapidamente. Caso persista ou surjam novos sinais que lhe suscitem dúvidas, deve contactar o seu médico ou dirigir-se à urgência.